



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ШОЛОХОВСКОМ,
ВЕРХНЕДОНСКОМ, БОКОВСКОМ, КАШАРСКОМ РАЙОНАХ**

ул. Сосновый Бор, 1а, ст. Вешенская, Шолоховский район, Ростов-
ская область, 346270

тел. (86353) 71-2-05, факс. (86353) 71-2-04

E-mail: rpn42@donpac.ru [http: www.61.rospotrebnadzor.ru](http://www.61.rospotrebnadzor.ru)

ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008

ИНН 6167080043 КПП 616701001

17.03.2020 г. № 25-86/1199

На _____ от _____

***О мерах по профилактике природно-
очаговых инфекций и малярии в 2020 г.***

В Ростовской области в сезон 2019 г. эпидемиологическая ситуация по природно-очаговым инфекциям продолжала оставаться напряженной.

Зарегистрировано 48 лабораторно подтвержденных случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) на 19 административных территориях, с максимальным числом заболевших в Сальском (10) и Зимовниковском (9) районах, против 27 случаев в 2018 году.

В 2019 г. продолжилось расширение эпидемически активной территории природного очага КГЛ, впервые выявлен случай заболевания в Константиновском районе.

Инфицирование людей проходило при реализации трансмиссивного и контактного механизмов передачи вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки. В 28,0% случаев инфицирование произошло при укусе клещами, в 14% случаев – при выполнении сельскохозяйственных работ, в том числе во время ухода за сельскохозяйственными животными.

Согласно прогнозу референс-центра по КГЛ (Ставропольский научно-исследовательский институт Роспотребнадзора) сохраняющиеся высокие показатели численности и инфицированности основного переносчика – клещей *H. marginatum* могут способствовать развитию неблагоприятной эпидемиологической обстановки с возможным ростом заболеваемости в 2020г.

Случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (20) зарегистрированы в г.г. Ростов-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге, шахтах, Зимовниковском районе.

В 2019 году в области резко обострилась ситуация по лихорадке Западного Нила (ЛЗН); зарегистрировано 93 случая заболевания, что в 3,7 раза выше уровня 2018 года. Эпидемические проявления зарегистрированы на 14 административных территориях, максимальное число заболевших отмечено в г.г. Ростов-на-Дону – 36, Таганроге -11, Мясниковском районе -14, Неклиновском районе – 13.

При этом, организационные и дезинсекционные мероприятия практически повсеместно проводятся несвоевременно и в недостаточных объемах.

С учетом наличия переносчиков, благоприятных климатических условий и заноса инфекции из эндемичных территорий на сегодняшний день сохраняется реальная угроза возникновения случаев малярии с местной передачей.

В 2019г. лептоспироз зарегистрирован в Аксайском и Багаевском районах, ситуация продолжается оставаться нестабильной.

Область расположена на территории природных очагов двух типов- пойменно-болотного и степного; энзоотичными являются 35 административных района.

Недостатки в организации мероприятий по защите от грызунов приводят к заболеваемости людей.

Так, за период 2018-2019гг. зарегистрировано 2 случая заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в Песчанокопском и Сальском районах.

Наличие сочетанных природных очагов различных инфекций с трансмиссивным механизмом передачи увеличивает риск заражения людей одновременно несколькими патогенами, что в свою очередь требует комплексного подхода к проведению профилактических мероприятий с целью предупреждения эпидемических проявлений.

В комплексе противоэпидемических мероприятий дезинсекция и дератизация – снижение численности кровососущих членистоногих –переносчиков и мелких млекопитающих- носителей возбудителей инфекций, являются основными мерами подавления активности природных очагов туляремии, ГЛПС, КГЛ, ЛЗН, ИКБ.

Важная роль в борьбе с природно-очаговыми инфекциями отводится также мерам специфической профилактики – необходимо своевременно прививать контингенты риска.

Погодно-климатические условия зимнего периода 2019-2020гг. являются благоприятными для жизнедеятельности и сохранения численности носителей и переносчиков инфекций.

По данным Роспотребнадзора прогноз по заболеваемости природно-очаговыми инфекциями на 2020 год остается неблагоприятным, поэтому основными остаются мероприятия по регулированию численности носителей и переносчиков природно-очаговых инфекций (клещей, комаров, грызунов), а также меры специфической профилактики контингентов риска.

В целях предупреждения возникновения и распространения природно-очаговых инфекций и малярии, в соответствии со ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

предлагаю:

1. В связи с ранним началом теплого периода в весеннем сезоне 2020 года и предстоящими весенними школьными каникулами предлагаем принять меры по проведению санитарной очистки территорий, в том числе прилегающих к ним территорий образовательных и дошкольных организаций.
2. Принять меры по проведению истребительных мероприятий направленных на предупреждение и снижение численности иксодовых клещей и грызунов на территориях образовательных организаций
3. Обеспечить в рекреационных зонах населенного пункта, природных и антропогенных очагов проведения систематических дератизационных (в весенний и осенний периоды) и экстренных мероприятий (по эпидемическим и санитарно-гигиеническим показателям).
4. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на поддержание санитарного состояния объектов и прилегающей территории (в том числе выкашивание сорной растительности) в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

5. Обеспечить организацию и проведение на объектах дезинсекционных (в том числе комароистребительных) и дератизационных мероприятий в соответствии с санитарными правилами, другими нормативно-методическими документами, регламентирующими проведение данных видов работ.
6. Взять под контроль проведение мероприятий по учету численности грызунов, членистоногих при выполнении учетно-истребительных работ.
7. Организовать проведение энтомологического обследования территорий с целью определения видового состава и численности иксодовых клещей с последующим проведением истребительных противоклещевых работ (включая мероприятия по контролю эффективности, выполненные специалистами прошедшими обучение по данному профилю).
8. Принять меры по обеспечению грызунонепроницаемости объекта путем проведения инженерно-технических, ремонтно-строительных мероприятий.
9. Обеспечить проведение профилактических прививок в рамках календаря профилактических прививок в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям.

О выполнении вышеуказанных мероприятий информацию направить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах (346270, Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вёшенская, ул. Сосновый Бор, 1а, тел.:8(863-53)71-2-05, факс 8(863-53)71-2-04, по электронной почте (rpn42@donpac.ru) к 20.04.2020г. и 18.11.2020г.

Приложение: памятка по профилактике КГЛ.

**Начальник
территориального отдела**

В.В.Круглов

Киреева О.В.-8-9614070778

Профилактика клещевых инфекций

Клещи, паразитируя на животных и человеке, являются специфическими или механическими переносчиками возбудителей природно-очаговых инфекций вирусной, микробной, риккетсиозной и протозойной этиологии.

Иксодовые клещи могут сохранять и передавать возбудителей туляремии, клещевого вирусного энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, клещевые риккетсиозы (в том числе гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека), Конго-Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), Омской геморрагической лихорадки, клещевого сыпного тифа Северной Азии, марсельской лихорадки, коксиеллеза (лихорадки Ку) и других.

Для инфекций, передающихся иксодовыми клещами, характерна весенне-осенняя сезонность с апреля по октябрь.

Для *H. marginatum* - с марта по август; у *I. ricinus* и клещей рода *Dermacentor* имеется также второй осенний (меньший) подъем численности активных взрослых клещей с августа по октябрь.

При присасывании одного клеща могут возникать сочетанные заболевания.

Группами риска по заболеваемости инфекциями, передающимися иксодовыми клещами, являются жители городской и сельской местности, посещающие природные биотопы или проживающие в антропогенных очагах.

Среди профессиональных групп наибольшему риску заражения инфекциями, передающимися клещами, подвержены лица, занятые в сельскохозяйственной, гидромелиоративной, строительной, заготовительной, промысловой, геологической, изыскательской, экспедиционной, дератизационной, дезинсекционной, озеленительной, лесозаготовительной, лесоустроительной деятельности, а также ветеринарные работники; специалисты лабораторий, осуществляющие диагностические или научные исследования в отношении инфекций, передающихся клещами.

Наибольшему риску заражения КГЛ подвержены ветеринары, пастухи, доярки, скотники, лица, занятые в забое и стрижке скота, в полеводческих и других сельскохозяйственных работах.

Вакцины существуют только от клещевого вирусного энцефалита и туляремии.

Любое присасывание клеща должно вызывать настороженность и стремление вовремя начать лечение.

Лучшим способом профилактики всех этих заболеваний является предотвращение присасывания клещей!

Клещи поджидают своих жертв на травяной растительности, реже на кустарниках, но никогда не заползают на деревья, не падают и не прыгают с них. Стоит рядом с клещом оказаться животному или человеку, как клещ прицепляется к коже, шерсти, одежде и

ползет вверх, пока не найдет укромное место, обычно под одеждой, чтобы присосаться к телу. У человека это чаще спина, подмышки, пах, у животных — голова, шея, пах. Ползёт клещ всегда вверх, поэтому обнаруживают их часто на шее и голове.

Если клещи встречаются на вашем дачном участке, надо заказать профессиональную обработку территории акарицидами (на сайте ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора www.niid.ru приведена информация о разрешенных для применения с данной целью химических средствах).

Помещения также надо оберегать от случайного заноса клещей: не вносить свежесорванные цветы и ветки, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи. Необходимо осматривать домашних животных и пинцетом снимать присосавшихся клещей.

При нахождении на опасной в отношении клещей территории надо обеспечивать себе и своим близким личную защиту от нападения клещей.

Выходя в лес, парк или на любую территорию, где встречаются клещи, необходимо одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей. Брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Верхняя часть одежды (рубашка, куртка) должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов плотно прилегать к руке. Ворот рубашки и брюки не должны застегиваться на пуговицы, лучше иметь застёжки типа "молния" или "липучка", через которую клещ не может заползти под одежду. На голову предпочтительно надеть капюшон, плотно пришитый к куртке, в крайнем случае, волосы должны быть заправлены под косынку. Лучше, чтобы одежда была однотонной и светлой, так как на ней клещи более заметны. Само- и взаимоосмотры на предмет обнаружения клещей (в том числе ползущих сзади) необходимо проводить каждые 15 – 20 минут. Этот способ может существенно снизить риск присасывания клеща к телу, но полной гарантии он не дает. Необходимо соблюдать особую осторожность, садясь или ложась на траву, поскольку в этой ситуации клещ может прицепиться сразу к верхней части одежды или к голове и заметить его будет трудно.

Индивидуальная защита населения от нападения клещей должна осуществляться в первую очередь с помощью высокоэффективных инсектоакарицидных (акарицидных) и инсектоакарицидно-репеллентных (акарицидно-репеллентных) средств в форме аэрозолей, разрешенных для применения специально с этой целью

Для индивидуальной защиты людей от клещей — переносчиков возбудителей КГЛ рекомендовано применение только средство "Пикник Супер (Picnic Super)–антиклещ".

После возвращения домой следует провести полный осмотр тела и одежды. Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить, стараясь не оторвать погруженный в кожу гипостом, ранку продезинфицировать (раствором йода, спиртом).

Чем быстрее Вы это сделаете, тем меньше в кровь попадет опасных возбудителей!

Если Вы почувствовали изменения в самочувствии, отметили повышение температуры, увеличивающееся красное пятно на месте присасывания, то необходимо немедленно обратиться к врачу, сообщив ему о факте присасывания клеща.

